

Захистіть свою дитину від важкого перебігу РСВ


Січень 2025

Респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) — це поширений вірус, який вражає легені. Він може бути дуже небезпечним для немовлят і людей похилого віку. Це найчастіша причина госпіталізації немовлят. На щастя, є два способи захистити немовлят від важкого перебігу РСВ, і здебільшого потрібен лише один з них: або вакцина проти РСВ, яку вводять під час вагітності, або антитіла проти РСВ, що називаються нірсевімаб, які вводять дитині. Ваше немовля може мати право на введення нірсевімабу в пологовому будинку після народження. Препарат забезпечує **негайний захист** від РСВ **тривалістю щонайменше п'ять місяців**.

Якщо вам потрібна допомога з доступом до цієї інформації або її розумінням, напишіть на адресу ahs.vdhimmunizationprogram@vermont.gov.

Ефективність нірсевімабу у запобіганні госпіталізації немовлят з тяжким РСВ становить 90%.

Факти щодо РСВ



- Сезон РСВ починається восени й сягає піку взимку.
- Він може поширюватися під час кашлю або чхання інфікованої людини, за прямого контакту з хворим на РСВ або через дотик до зараженої поверхні.
- У багатьох дорослих із РСВ немає жодних симптомів. У тих, хто хворіє, зазвичай спостерігається легке нездужання, схоже на застуду.
- У зовсім маленьких немовлят, хворих на РСВ, майже завжди спостерігаються симптоми. До них належать дратівливість, зниження активності, зменшення вживання рідини та їжі, а також апное (паузи в диханні понад 10 секунд).
- РСВ здатен викликати важкі захворювання в немовлят і маленьких дітей, такі як бронхіт (запалення дрібних дихальних шляхів у легенях) або пневмонія (інфекція легенів).

Антитіла проти РСВ (нірсевімаб)



- Антитіла проти РСВ вводяться одноразово.
- Рекомендується немовлятам віком до 8 місяців, які не захищені вакциною проти РСВ, що вводиться матері. Препарат призначають немовлятам у період із жовтня по березень.
- Побічні ефекти зазвичай легкі та швидко минають.



HealthVermont.gov/RSV
802-863-7200

 **VERMONT**
DEPARTMENT OF HEALTH